



راهنمای آموزش به بیمار

## داروی آپیکسابان



کمپانی آموزش سلامت

### عوارض جانبی جدی آپیکسابان

در صورت بروز شرایط زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید:  
ایجاد بثورات پوستی که ممکن است خارشی، قرمز رنگ،  
متورم، شبیه تاول یا باعث لایه لایه ای شدن پوست شود.  
خس خس کردن سینه، سرفه خونی یا وجود خون در  
استفراغ

ایجاد تنگی نفس یا اشکال در صحبت کردن  
ایجاد تورم در دهان، صورت، لب ها، زیان یا گلو  
ادرار قرمز، صورتی یا قهوه ای یا مدفوع قرمز یا سیاه رنگ  
سردرد، سرگیجه، علائم گرگز، بی حسی یا ضعف عضلانی به  
ویژه در پاهای

منبع:

<https://abiapharma.com/product/abi-quit/>  
<https://aburahian.com/>

### موارد منع مصرف:

حساسیت به آپیکسابان

خونریزی زیاد

وجود بیماری در یکی از ارگان های بدن که رسیک خونریزی جدی را افزایش دهد مانند زخم فعال یا اخیر معده یا روده، خونریزی اخیر مغزی، بیماری انعقادی کبدی

صرف داروهای جلوبگیری از لخته خون مانند وارفارین، ریوازوکسابان، هپارین

### عوارض جانبی

از عوارض جانبی شایع این دارویی توان به خونریزی خفیف که ممکن است به صورت خون دماغ، کبدی بی دلیل، خونریزی بیشتر قاعده‌ی خونریزی لته هنگام مسوک زدن اشاره کرد.



کبدی بی دلیل در اندام هایی از عوارض جانبی دارویی باشد.

### تداخلات دارویی:

صرف همزمان داروهای زیر ممکن است باعث افزایش اثرات داروی آپیکسابان و احتمال خونریزی ناخواسته شود پس در صورت صرف با پزشک خود مشورت کنید.

برخی داروهای ضد فارج مانند کتونکوتازول و اینترکوتازول برخی داروهای ضد ویروس مانند ریتوناوبر سایر داروهایی که برای کاهش لخته خون استفاده میشوند مانند انوکسپارین

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و ضد درد مانند آسپرین یا تاپروکسن

داروهای پایین آورنده فشار خون یا بیماری های قلبی مانند دیلتیازیم، وراپامیل

داروهای ضد افسردگی، اسید های چرب امگا 3 و ویتامین ای، کلاریترومایسین و اریترومایسین

صرف همزمان داروهای زیر ممکن است باعث کاهش اثر داروی آپیکسابان شود:

برخی داروهای ضد صرع مانند فنی توین، کاریاماژین، فنوباربیتال، پرمیدون

داروهای مورد استفاده در سل مانند ریقامبیسین

### نکات مهم در نحوه مصرف دارو:

این دارو را هر روز پک زمان مشخص طبق دستور پزشک استفاده کنید.

قرص را به طور کامل با آب بلع نمایید. در صورت اشکال در بلع می توانید قرص را خرد کرده و با آب یا آب سیب یا پوره سیب مخلوط کرده و بلا فاصله صرف کنید.

از صرف همزمان آپیکسابان با آب گریپ فروت خودداری نمایید.

از قطع صرف ناگهانی این دارو بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید زیرا رسک تشکیل لخته خون در صورت قطع زود هنگام درمان وجود دارد.

در صورتی که پک نوبت از صرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن فورا آن را میں نمایید و اگر زمان صرف دوز بعدی دارو نزدیک است از دو برابر کردن مقدار دارو پرهیز کنید. در صورت فراموش کردن صرف بیش از پک نوبت دارو با پزشک خود مشورت کنید.

## الاکوئیت یا آپیکسابان چیست



نمونه ای از قرص های 2/5 و 5 میل گرمی قرص آپیکسابان

آپیکسابان نوعی داروی ضد انعقاد خواری است که به شکل قرص های 2/5 و 5 میل گرمی موجود می باشد.

### موارد مصرف:

جهت پیشگیری از سکته مغزی، سکته قلبی، جلوگیری از ایجاد لخته خون در عروق ریوی و وریدهای عمق و همچنین بعد از جراحی تعویض مفصل زانو و لگن مورد استفاده قرار میگیرد.