




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز آموزشی درمانی

راهنمای آموزش به بیمار قرص پلاویکس



کمیته آموزش سلامت

سال ۱۴۰۴

نکات مهم:

-قبل از مصرف کلوپیدوگرل اگر به آن یا داروهای مشابه ضد پلاکت آثری دارید به پزشک خود بگویید.

-قبل از استفاده از این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید به خصوص در شرایط خونریزی (مانند زخم معده، خونریزی در مغز / چشم)، جراحی اخیر، آسیب جدی / تروما، بیماری کبدی، بیماری خونریزی (مانند هموفیلی)

-از فعالیت هایی که خطر خونریزی یا جراحات را افزایش می دهد، پرهیز کنید. هنگام مسواک زدن یا اصلاح کردن بیشتر مراقب جلوگیری از زخم و خونریزی باشید.

-برای کاهش احتمال بریدن، کبود شدن یا آسیب رساندن، با اشیاء تیز مانند ریش تراش ها و برش ناخن و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر ورزش های ارتباطی، با احتیاط استفاده کنید.

-اگر به جراحی یا کار دندان نیاز دارید قبل از جراحی به جراح یا دندانپزشک بگویید.

-آزمایشات پزشکی (مانند شمارش کامل خون) ممکن است به صورت دوره های انجام شود تا عوارض جانبی را بررسی کنید.

-پلاویکس را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.

-در دمای اتاق دور از نور و گرما و رطوبت نگهداری کنید



منبع: سامی پوران داروهای ژنریک
ایران. تهران. بشری. ۱۳۹۴.

هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمایید

دارو را در ساعت خاص از روز مصرف کنید که آن را فراموش نکنید.

در صورت بروز عوارض گوارشی حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت فراموش کردن مصرف قرص به محض این که به یاد آوردید، دارو را مصرف کنید. در صورتی که تقریباً نوبت بعدی فرا رسیده باشد، لازم نیست نوبت فراموش شده را جبران کنید. نباید برای جبران نوبت از دست رفته، داروی بیشتری مصرف کنید. یعنی نباید در نوبت بعدی، دو برابر مصرف کنید.

چه داروهایی بر پلاویکس تأثیر می گذارند؟

برخی از داروها نیز ممکن است در صورت مصرف همزمان با پلاویکس، احتمال خونریزی را افزایش دهد. در صورتی که آسپیرین مصرف می کنید به خصوص اگر سکت قلبی داشته اید، پیش از مصرف پلاویکس با پزشک صحبت کنید.

به طور کلی تمام داروهایی را که مصرف می کنید به اطلاع پزشک برسانید. به خصوص داروهای رقیق کننده خون (مانند وارفارین یا کومادین، ريواروکسابان یا زالربان) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند آسپرین، ناپروکسن، دیکلوفناک، ایندومتاسین ملوکسیکام و ایبوپروفن داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین (پروزاک)، دولوکستین، پاروکستین، ترازودون و غیره



آثریوپلاستی

پلاویکس

نام تجاری: پلاویکس

نام ژنریک: کلوپیدوگرل

شکل دارویی :

قرص ۷۵ میلی گرم



اثر پلاویکس چیست؟

یک مهار کننده تجمع پلاکتی است که با کاهش و یا متوقف کردن پلاکت ها از چسبیدن به دیواره های رگ های خون و یا بافت های مجروح جلوگیری می کند و کمک می کند تا جریان خون حفظ شود.

موارد مصرف پلاویکس چیست؟

پلاویکس یک داروی ضد لخته شدن خون است که ثابت شده است خطر بروز سکته قلبی و گرفته شدن فتر توسط لخته خون را کاهش می دهد.

در افراد مبتلا به اختلالات خاص قلبی یا عروق خونی، به منظور جلوگیری از لخته شدن خون پس از حمله اخیر قلبی یا سکته مغزی استفاده می شود . موارد مصرف پلاویکس در کاهش خطر سکته مغزی ، حمله قلبی ، سایر مشکلات گردش خون ناشی از تنگی و سخت شدن رگ ها و یا برخی از مشکلات قلبی دیگری باشد .

داروی پلاویکس به دلیل اینکه شما تحت آنژیوپلاستی عروق قلبی قرار گرفته اید برای شما تجویز کرده است. که منجر به کاهش گرفتگی استنت (فتر) تعبیه شده میشود .

مصرف پلاویکس در دوران بارداری :

پلاویکس برای جنین خطری ندارد اما در دوران بارداری، این دارو باید تنها زمانی استفاده شود که مورد نیاز باشد.

در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید، موضوع را به اطلاع پزشک برسانید.

هنوز مشخص نیست که آیا این دارو از طریق شیر مادر به کودک منتقل می شود یا خیر . بنابراین در حین مصرف دارو نباید کودک را از شیر خود تغذیه کنید .

در موارد زیر پیش از مصرف این دارو، با پزشک صحبت کنید :

- اختلالات خونی یا انعقاد خونی مانند هموفیلی
- سابقه سکته مغزی و خونریزی مغزی
- در صورتی که به داروهای مشابه مانند پراسوگرل، تیکاگرلور و تیکلوپیدین آلرژی دارید
- حساسیت به پلاویکس یا کلوپیدوگرل
- خونریزی گوارشی یا مغزی اخیر
- سابقه زخم معده یا کولیت زخمی و یا مشکلات شدید گوارشی
- جراحی اخیر حتی جراحی دندانپزشکی
- مشکلات کبدی و کلیوی
- برنامه جراحی در یک هفته آینده
- تصادف شدید و صدمات داخلی ناشی از آن



عوارض احتمالی :

-مدفوع خونی / سیاه یا قیری

-رنگ پریدگی، ضعف، تب و یا زردی (زردی پوست یا چشمها)

-درد شدید معده یا شکم

-تب، علائم عفونت و خستگی جدید

-کبودی آسان و خونریزی غیر طبیعی و غیرقابل کنترل از لثه یا دهان یا بینی و واژن یا مقعد

-استفراغ یا بالا آوردن خون که به رنگ قهوه به نظر می رسد .

باید سابقه ی مشکلات انعقادی و یا خونریزی های

مختلف را به اطلاع پزشک معالج برسانید

واکنش بسیار حساس به آلرژیک این دارو نادر است. با این حال، اگر متوجه علائمی از جمله: خارش، تورم (به ویژه در صورت / زبان / گلو)، سرگیجه شدید، مشکل تنفس، در صورت بروز هرگونه مداخله درمانی، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

چه مدت باید پلاویکس مصرف کنید:

تا مدت مشخص شده توسط پزشک ادامه مصرف پلاویکس ادامه دهید. قطع زودتر از موعد دارو می تواند سبب ایجاد لخته و گرفتگی در عروق قلب و فتر گردد. . بیمارانی که فتر دارویی برای آنان استفاده شده است لازم است مدت طولانی تری از این دارو استفاده کنند که این مدت حداقل شش ماه تا یک سال می باشد. البته توصیه می شود که در مورد ادامه یا قطع داروی پلاویکس حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنید و از قطع سرخود دارو خودداری نمایید .